

Como fazer um supercondutor de temperatura ambiente

António Saraiva -- 2006-12-01

ajps2@hotmail.com

Abstract – A fórmula geral da força na “Teoria unificada da relatividade absoluta” (em General Science Journal) permite uma força atractiva entre os electrões, para características particulares do meio, o que explica a formação dos Cooper-pair.

Força entre os electrões dos pares de Cooper

Segundo a TURA:
$$F = \frac{kh(c^2 - v^2)^2 f_0^4}{c^2 (c^2 + vw_0)(w_0 + v)^3}$$

Se v for imaginário: $v = iV \quad \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow F = \frac{kh(c^2 + V^2)^2 f_0^4}{c^2 (c^4 + V^2 w_0^2)(w_0^2 + V^2)^3} \left[(w_0^3 c^2 - 3c^2 V^2 w_0 + V^4 w_0 - 3V^2 w_0^3) + i(3V^3 w_0^2 - V w_0^4 - 3c^2 V w_0^2 + V^3 c^2) \right]$$


Para uma força atractiva real:

$$w_0^3 c^2 - 3c^2 V^2 w_0 + V^4 w_0 - 3V^2 w_0^3 \leq 0$$

Gráfico da força real

F_{ee}

$$V = \frac{c}{\sqrt{3 + \sqrt{8}}}$$



Potencial gravitacional

$$V^2 = \frac{2Gm_0}{x_0} \quad \text{e} \quad F = -G \frac{m_0^2}{x_0^2} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad V^2 = \frac{-2Fx_0}{m_0}$$

Quando na fase supercondutora as partículas do material comportam-se como buracos negros para os electrões.

O vácuo é um super fluido porque estamos a viver á superfície de um buraco negro.

$$c^2 = \frac{2x_0kh(c^2 + c^2)^2 f_0^4}{m_0c^2(c^4 + c^2w_0^2)(w_0^2 + c^2)^3} (w_0^3c^2 - 3c^4w_0 + c^4w_0 - 3c^2w_0^3)$$

$$\text{Com} \quad V \approx c \quad \text{e} \quad w_0 \approx c \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{m_0}{x_0} = \frac{2khf_0^4}{c^5} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{m_0}{x_0} = \frac{h}{2kc}$$

$$\underline{\underline{\frac{m}{x} = 1.6174 \times 10^{-16}}}}$$

Esta é a formula de um supercondutor de temperatura ambiente. m é a massa da partícula composta e x é metade da distancia entre as partículas.

Tabela de m e x dos elementos

H 1.67 -27 1.99																	He 6.64 -27 2.59
Li 1.15 -26 2.16	Be 1.50 -26 1.56											B 1.79 -26 1.52	C 1.99 -26 1.60	N 2.33 -26 2.05	O 2.66 -26 2.24	F 3.15 -26 2.17	Ne 3.35 -26 2.38
Na 3.81 -26 2.93	Mg 4.04 -26 2.45											Al 4.48 -26 2.21	Si 4.66 -26 2.36	P 5.14 -26 2.63	S 5.32 -26 2.57	Cl 5.88 -26 2.93	Ar 6.63 -26 3.15
K 6.49 -26 4.12	Ca 6.65 -26 3.42	Sc 7.46 -26 2.86	Ti 7.95 -26 2.56	V 8.46 -26 2.35	Cr 8.63 -26 2.26	Mn 9.12 -26 2.29	Fe 9.27 -26 2.30	Co 9.78 -26 2.20	Ni 9.74 -26 2.14	Cu 1.05 -25 2.20	Zn 1.09 -25 2.38	Ga 1.16 -25 2.61	Ge 1.21 -25 2.73	As 1.24 -25 2.68	Se 1.31 -25 2.92	Br 1.33 -25 3.40	Kr 1.39 -25 3.67
Rb 1.42 -25 4.94	Sr 1.45 -25 4.19	Y 1.48 -25 3.52	Zr 1.51 -25 3.14	Nb 1.54 -25 2.90	Mo 1.59 -25 2.75	Tc 1.64 -25 2.66	Ru 1.68 -25 2.66	Rh 1.71 -25 2.65	Pd 1.77 -25 2.62	Ag 1.79 -25 2.77	Cd 1.87 -25 3.00	In 1.91 -25 3.20	Sn 1.97 -25 3.24	Sb 2.02 -25 3.37	Te 2.12 -25 3.50	I 2.11 -25 3.80	Xe 2.18 -25 4.53
Cs 2.21 -25 5.92	Ba 2.28 -25 4.89	Lu 2.91 -25 4.42	Hf 2.96 -25 3.46	Ta 3.00 -25 3.23	W 3.05 -25 3.06	Re 3.09 -25 3.02	Os 3.16 -25 2.98	Ir 3.19 -25 3.01	Pt 3.24 -25 2.95	Au 3.27 -25 3.07	Hg 3.33 -25 3.46	Tl 3.39 -25 3.66	Pb 3.44 -25 3.74	Bi 3.47 -25 3.96	Po 3.47 -25 4.06	At	Rn

Exemplo: Hidrogénio $m = 1.67 \times 10^{-27}$; $x = 1.99 \times 10^{-10}$

Calculo de x :

$$\text{Densidade } \rho = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi x^3} \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{\frac{3m}{4\pi\rho}}$$

Tabela do factor da supercondutividade m/x

H 8.39 -18																	He 2.56 -17
Li 5.32 -17	Be 9.62 -17											B 1.18 -16	C 1.24 -16	N 1.14 -16	O 1.19 -16	F 1.45 -16	Ne 1.41 -16
Na 1.30 -16	Mg 1.65 -16											Al 2.03 -16	Si 1.97 -16	P 1.95 -16	S 2.07 -16	Cl 2.01 -16	Ar 2.10 -16
K 1.58 -16	Ca 1.94 -16	Sc 2.61 -16	Ti 3.11 -16	V 3.60 -16	Cr 3.82 -16	Mn 3.98 -16	Fe 4.03 -16	Co 4.45 -16	Ni 4.55 -16	Cu 4.77 -16	Zn 4.58 -16	Ga 4.44 -16	Ge 4.43 -16	As 4.63 -16	Se 4.49 -16	Br 3.91 -16	Kr 3.79 -16
Rb 2.87 -16	Sr 3.46 -16	Y 4.20 -16	Zr 4.81 -16	Nb 5.31 -16	Mo 5.78 -16	Tc 6.17 -16	Ru 6.32 -16	Rh 6.45 -16	Pd 6.76 -16	Ag 6.46 -16	Cd 6.23 -16	In 5.97 -16	Sn 6.08 -16	Sb 5.99 -16	Te 6.06 -16	I 5.55 -16	Xe 4.81 -16
Cs 3.73 -16	Ba 4.66 -16	Lu 6.58 -16	Hf 8.55 -16	Ta 9.29 -16	W 9.97 -16	Re 1.02 -15	Os 1.06 -15	Ir 1.06 -15	Pt 1.10 -15	Au 1.07 -15	Hg 9.62 -16	Tl 9.26 -16	Pb 9.20 -16	Bi 8.76 -16	Po 8.55 -16	At	Rn

Soma de dois comprimentos de onda

Quando duas frequências interagem:

$$f = f_1 + f_2 \quad \text{ou, e} \quad f = f_1 - f_2 \quad \text{como} \quad f = \frac{c}{x}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \quad \text{ou, e} \quad \frac{1}{x} = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}$$

Soma de duas massas: $m = m_1 + m_2$

Um supercondutor de temperatura ambiente com dois elementos

$$\frac{m}{x} = 1.62 \times 10^{-16} ; \quad m = m_1 + nm_2 ; \quad \frac{1}{x} = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}$$

Elementos Al e Si:

$$\text{Al -- } m_1 = 4.48 \times 10^{-26} ; \quad x_1 = 2.21 \times 10^{-10}$$

$$\text{Si -- } m_2 = 4.66 \times 10^{-26} ; \quad x_2 = 2.36 \times 10^{-10}$$

$$n = \frac{x_1 x_2 1.62 \times 10^{-16} - m_1 |x_2 - x_1|}{m_2 |x_2 - x_1|} \Leftrightarrow n = 23$$

Temos assim um supercondutor de temperatura ambiente: AlSi₂₃

Com Zn e Si: ZnSi₁₉₁

De acordo com a nossa teoria um pouco mais ou menos de Al e Zn no silício destrói a supercondutividade.